

氟苯尼考子宫注入剂说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：氟苯尼考子宫注入剂

商品名称：

英文名称：Florfenicol Intrauterine Infusion

汉语拼音：Fubennikao Zigongzhuruji

【主要成分】 氟苯尼考

【性状】 本品为无色至淡黄色液体。

【药理作用】 酰胺醇类抗生素。氟苯尼考对多种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及支原体有较强的抗菌活性。对溶血性巴氏杆菌、多杀巴氏杆菌、猪胸膜肺炎放线杆菌高度敏感，对链球菌、耐甲砒霉素的痢疾志贺氏菌、伤寒沙门氏菌、克雷伯氏杆菌、大肠埃希菌及耐氨苄西林流感嗜血杆菌均敏感。

【作用与用途】 酰胺醇类抗生素。用于敏感细菌所致牛的子宫内膜炎。

【用法与用量】 子宫内灌注：一次量，牛 25ml (1 支)。每 3 日 1 次，连用 2~4 次。

【不良反应】 过量使用可引起奶牛短暂的厌食、饮水减少和腹泻，停药后几日即可恢复。

【注意事项】 怀孕母牛禁用。

【休药期】 牛 28 日；弃奶期 7 日。

【规格】 25ml : 2g

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】