

硫酸黏菌素注射液说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：硫酸黏菌素注射液

商品名称：

英文名称：Colistin Sulfate Injection

汉语拼音：Liusuan Nianjunsu Zhushuye

【主要成分】 硫酸黏菌素

【性状】 本品为微黄色或淡黄色的澄明液体。

【药理作用】 多肽类抗生素。黏菌素为窄谱抗生素，主要对大肠埃希菌、沙门氏菌等革兰氏阴性菌有较强的抗菌作用。黏菌素的杀菌机理是损害细菌细胞膜，增加其通透性，使菌体内氨基酸、嘌呤、嘧啶、 K^+ 等外漏，亦能影响核酸和核糖体功能，导致细菌死亡。

【作用与用途】 多肽类抗生素。用于治疗哺乳期仔猪大肠埃希菌病。

【用法与用量】 肌内注射：一次量，每 10kg 体重，哺乳期仔猪 0.8~1.6ml。一日 2 次，连用 3~5 日。

【不良反应】 (1) 多黏菌素全身应用可引起肾毒性、神经毒性和神经肌肉阻断效应。

(2) 与能引起肾功能损伤的药物合用，可增强其毒性。

【注意事项】 (1) 不能与碱性物质一起使用。

(2) 本品毒性大，安全范围窄，严格按照推荐剂量使用。

【休药期】 猪 28 日。

【规格】 2ml：50mg (150 万单位)

【包装】

【贮藏】 遮光，密闭，在干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

硫酸黏菌素注射液说明书

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称：硫酸黏菌素注射液

商品名称：

英文名称：Colistin Sulfate Injection

汉语拼音：Liusuan Nianjunsu Zhusheyeye

【主要成分】 硫酸黏菌素

【性状】 本品为微黄色或淡黄色的澄明液体。

【药理作用】 多肽类抗生素。黏菌素为窄谱抗生素，主要对大肠埃希菌、沙门氏菌等革兰氏阴性菌有较强的抗菌作用。黏菌素的杀菌机理是损害细菌细胞膜，增加其通透性，使菌体内氨基酸、嘌呤、嘧啶、 K^+ 等外漏，亦能影响核酸和核糖体功能，导致细菌死亡。

【作用与用途】 多肽类抗生素。用于治疗哺乳期仔猪大肠埃希菌病。

【用法与用量】 肌内注射：一次量，每1kg体重，哺乳期仔猪0.1~0.2ml。一日2次，连用3~5日。

【不良反应】 (1) 多黏菌素全身应用可引起肾毒性、神经毒性和神经肌肉阻断效应。

(2) 与能引起肾功能损伤的药物合用，可增强其毒性。

【注意事项】 (1) 不能与碱性物质一起使用。

(2) 本品毒性大，安全范围窄，严格按照推荐剂量使用。

【休药期】 猪28日。

【规格】 (1) 5ml : 0.1g (300万单位) (2) 10ml : 0.2g (600万单位)

【包装】

【贮藏】 遮光，密闭，在干燥处保存。

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】